



2015



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

parki-lubina.pl • zoolubin.pl

BAŻANTY



wieloszpón wietnamski

Polyplectron germaini



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

STYCZEŃ 2016

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

LUTY 2016

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	1	2	3	4	5	6



bażant łowny
Phasianus colchicus



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

STYCZEŃ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

LUTY 2015

26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

bażant łowny

Phasianus colchicus

Gatunek introdukowany w Europie, Ameryce Północnej, Tasmanii i Nowej Zelandii. Dzikie populacje żyją na wschód od Morza Czarnego oraz na Kaukazie i dalej na wschód, aż do Chin. W Polsce pierwsze introdukcje odbywały się na Śląsku w l. 60. XVI w., na Pomorzu i Mazurach bażant pojawił się dopiero w poł. XIX w. Uważa się, że ptaki te zaadaptowały się do naszych warunków, ale gdyby zaprzestano wypuszczania młodych bażantów na wolność to liczebność gatunku prawdopodobnie spadłaby na naszych ziemiach do granicy wymarcia. Przychylność rolników zyskały po rozpowszechnieniu informacji, że jako jedne z nielicznych ptaków zjadają stonkę ziemniaczaną.

Długość ciała: samce 70-90 cm, samice 50-60 cm

Długość skrzydła: samiec 23,8-25,8 cm,
samica 21-22 cm

Masa ciała: samce 0,75-1,9 kg, samice 0,6-1,4 kg



bażant annamski
Lophura edwardsi



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

LUTY 2015

26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

MARZEC 2015

23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

bażant annamski

Lophura edwardsi

Inne nazwy tego gatunku to: kiściec annamski i bażant Edwardsa. Występuje w tropikalnych lasach Wietnamu. Przypuszczalnie wymarły w naturze, bądź tworzący bardzo małe i rozproszone grupy ptaków (brak dostatecznych danych z badań terenowych). Bażant Edwardsa zawdzięcza swoją nazwę francuskiemu zoologowi i paleontologowi Alfonsowi Milne-Edwards (1835-1900), który był dyrektorem Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Bażanty annamskie uwielbiają deszcz. W naturalnym środowisku, którym są lasy tropikalne strefy monsunowej deszcze zdarzają się wyjątkowo często, a w części roku codziennie. Może stanowić to przyczynę upodobania opadów.

Długość ciała: samce ok. 65 cm, samice ok. 58 cm

Długość skrzydła: samiec 22-24 cm,
samica 21-22 cm

Masa ciała: samce 1,1 kg, samice 1,05 kg





bażant kasztanowaty

Syrnaticus ellioti



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

MARZEC 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
--------------	--------	-------	----------	--------	--------	-----------

23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

KWIECIEŃ 2015

30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

bażant kasztanowaty

Syrmaticus ellioti

W naturalnym środowisku zamieszkują gęste lasy mieszane do wysokości ok. 2000 m n.p.m. Występuje na południowo-wschodnich terenach Chin, jednak jest gatunkiem zagrożonym. Liczba ptaków w hodowli jest dość wysoka, w związku z tym populacja ptaka jest stabilna. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego ornitologa Daniela Giraud Elliot (1835-1915), autora książek o bażantach oraz założyciela Amerykańskiego Stowarzyszenia Ornitologów. Okres rozrodczy może się zaczynać już w połowie marca, ale zazwyczaj rozpoczyna się w kwietniu i trwa aż do końca czerwca. Samica składa od 6 do 8 białoróżowych jaj.

Długość ciała: samce ok. 80 cm, samice ok. 55 cm

Długość skrzydła: samiec 23-24 cm,
samica 21-22,5 cm

Masa ciała: samce 0,8-1,2 kg, samice 0,7-1,1 kg





bażant himalajski

Catreus wallichii



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

KWIECIEŃ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

MAJ 2015

27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

bażant himalajski

Catreus wallichii

Występuje w zachodnich i środkowych Himalajach na wysokości od 1000 do 3300 m n.p.m., gdzie chętnie przebywa w trawach na stromych stokach, kopiąc silnym dziobem w poszukiwaniu pokarmu podobnie jak uszaki i olśniaki. Głównie żywią się bulwami, korzonkami, nasionami, jagodami oraz owadami, wiosną natomiast głównie zielonymi częściami roślin. Jako ciekawostkę można podać fakt, że nigdy nie obserwowano tego gatunku pijącego wodę. Bażanty te są gatunkiem monogamicznym. W okresie lęgowym kura składa od 7 do 14 jaj, które wysiaduje 26 dni. Młodymi zajmują się oboje rodzice. Poza okresem rozrodczym występują zwykle w małych grupach.

Długość ciała: samce 90-112 cm, samice 61-67 cm

Długość skrzydła: samiec 23,5-27 cm,
samica 22,5-24,5 cm

Masa ciała: samce 1,25-1,8 kg, samice 0,9-1,36 kg



bażant królewski
Syrnaticus reevesii



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

MAJ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

CZERWIEC 2015

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

bażant królewski

Syrmaticus reevesii

Długość ciała: samce 200 cm, z czego 160 cm to ogon, samice 75 cm, z czego 40 cm to ogon

Długość skrzydła: samiec 27,5-30 cm, samica 23,5-25 cm

Masa ciała: samce ok. 1,5 kg, samice ok. 0,95 kg

Zamieszkuje lasy rzadkie mieszane i liściaste z podszytem krzewiastym na wyżynach i w górach od 300 m do 2000 m n.p.m. Występuje w środkowych i północnych Chinach. W środowisku naturalnym żyje w niewielkich rodzinnych grupkach, natomiast w okresie lęgowym każdy kogut oddziela się od stada z jedną lub dwiema samicami w poszukiwaniu własnego rewiru. Noce spędza w koronach drzew, chociaż nie jest zbyt sprawny w locie, ze względu na długi ogon. Odporny na niskie temperatury. Bażant królewski jest największym z długoogoniastych bażantów. Żywi się głównie pokarmem roślinnym, owocami, zielonymi częściami roślin, nasionami, żołądkami, owadami, ślimakami i dżdżownicami. Owoce zjada bezpośrednio z krzewu, a dużą część pożywienia pozyskuje rozgrzebując nogami ziemię. W niedużym zagłębieniu, w krzewie lub trawie, samica składa 8-15 jaj i wysiaduje je około 24 dni licząc od zniesienia ostatniego jaja.



bażant nepalski
Lophura leucomelanos



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

CZERWIEC 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

LIPIEC 2015

29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

bażant nepalski

Lophura leucomelanos

Bażant ten występuje od zachodnich Himalajów po Półwysep Malajski, gdzie tworzy 9 podgatunków, zasiedlając głównie rejony górskie od 300 do 3350 m n.p.m. W środowisku naturalnym zachodnie podgatunki występują w lasach, natomiast wschodnie preferują pola uprawne i niziny. Pomimo, że samiec wyraźnie różni się od samicy jest to gatunek monogamiczny. W okresie lęgowym kura składa zwykle do ukrytego pod krzewem gniazda 6-9 jaj, które wysiaduje 24-25 dni. Żywią się nasionami, jagodami, bezkręgowcami czy zielonymi częściami roślin. Bażant nepalski jest bardzo blisko spokrewniony z bażantem srebrzystym, z którym łatwo się krzyżuje, czego należy unikać.

Długość ciała: samce 63-74 cm, samice 50-60 cm

Długość skrzydła: samiec 21-29,5 cm,

samica 19,8-23,5 cm

Masa ciała: samce 0,79-1,14 kg, samice 0,7-1,1 kg



bażant srebrzysty
Lophura nychemera



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

LIPIEC 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

SIERPIEŃ 2015

27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

bażant srebrzysty

Lophura nycthemera

Nazywany jest również kiścem srebrzystym. Piękny, ciekawski, wytrwały i majestatyczny ptak. Zasiedla gęste, górskie lasy, tereny porośnięte gęstymi zaroślami, bambusami, paprociami na wysokości 700-2100 m n.p.m., oraz pola uprawne. Świetnie znosi niskie temperatury, a nawet mrozy. Jest to raczej naziemny ptak, do lotu podrywa się w momencie zagrożenia. Powodem zmniejszającej się liczby tego gatunku w środowisku naturalnym jest utrata siedlisk. W Chinach był znany i hodowany od najdawniejszych czasów, wizerunek jego występował w starożytnej sztuce, a w literaturze uosabiano go z mitycznym białym feniksem.

Długość ciała: samce ok. 125 cm, samice ok. 65 cm

Długość skrzydła: samiec 22,5-30,5 cm,
samica 15-27 cm

Masa ciała: samce 1,1-2 kg, samice 1-1,3 kg



bażant złocisty
Chrysolophus pictus



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

SIERPIEŃ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

WRZESIEŃ 2015

31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

bażant złocisty

Chrysolophus pictus

Zamieszkuje młodsze, gęste, ciemne lasy sosnowe i modrzewiowe bez runa, rzadziej mieszane z bogatszym runem. Jest blisko spokrewniony z bażantem diamentowym. Dzień spędza na ziemi w poszukiwaniu pożywienia, noc natomiast wysoko na drzewie. Trudno zaobserwować ten gatunek w jego pierwotnym środowisku, dlatego też niewiele wiadomo o jego zachowaniu w naturalnych warunkach. Jest bardzo płochliwy. Spłoszony ucieka piechotą, rzadko podrywa się do lotu. To jeden z najwcześniej sprowadzonych bażantów do Europy. Choć źródła podają różne daty wiadomo, że nastąpiło to między XVII a XVIII wiekiem. Pierwsze osobniki trafiły do Anglii.

Długość ciała: samce 90-105 cm, samice 60-80 cm

Długość skrzydła: samiec 19-20,2 cm,
samica 17,9-19 cm

Masa ciała: samce ok. 1 kg, samice ok. 0,7 kg





olśniak himalajski

Lophophorus impejanus



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

WRZESIEŃ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

PAŹDZIERNIK 2015

28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

olśniak himalajski

Lophophorus impejanus

Niezwyczajnie piękny i elegancki ptak. Samce charakteryzują się metaliczną barwą piór, które wspaniale mienią się w blasku słońca. Samica podobnie, jak u większości bażantów, ubarwiona jest dość jednolicie w kolorze brązowym. Ich naturalnym środowiskiem są lasy dębowo-jodłowe z otwartymi zboczami trawiastymi i klifami położonymi na wysokości od 2500-5000 m n.p.m. W zimie schodzą na około 2000 m n.p.m., gromadząc się w większe stada. Ich silne nogi i dość duży zakrzywiony i mocny dziób przystosowane są do kopania w twardym górskim gruncie, który przekopują nawet do 25 cm głębokości. Olśniak jest narodowym ptakiem Nepalu. W poł. XIX w. sprowadzony do Europy.

Długość ciała: 64-72 cm

Długość skrzydła: samiec 28,9-32 cm,

samica 25,9-28,7 cm

Masa ciała: samce 1,98-2,38 kg, samice 1,8-2,15 kg



tragopan Temmincka

Tragopan temminckii



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

PAŹDZIERNIK 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

LISTOPAD 2015

26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

tragopan Temmincka

Tragopan temminckii

Nazwa została nadana na cześć holenderskiego przyrodnika Coenraada Jacoba Temmincka. Zwany jest również tragopanem modrolicym. Jest najmniej zagrożony z tragopanów, a przez wielu uważany za najładniejszego. Zamieszkuje tereny wilgotnych, chłodnych, wysokogórskich lasów (często rododendronowych lub bambusowych) na wysokości 1000-3600 m n.p.m., gdzie rzadko przebywa w pełnym słońcu. Prowadzi skryty i nadrzewny tryb życia. Gniazdo zakłada na drzewach lub półkach skalnych, zajmuje też często gniazda innych ptaków, skąd pisklęta po wyschnięciu wyskakują na ziemię. Tragopany jako jedyne z bażantów nie zakładają gniazd na ziemi.

Długość ciała: samce ok. 65 cm, samice ok. 58 cm

Długość skrzydła: samiec 22,5-26,5 cm,
samica 22-22,5 cm

Masa ciała: samce 1,35-1,45 kg, samice 0,9-1,05 kg



uszak biały

Crossoptilon crossoptilon



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

LISTOPAD 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

GRUDZIEŃ 2015

30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

uszak biały

Crossoptilon crossoptilon

Długość ciała: 86-96 cm

Długość skrzydła: samiec 27,2-39,5 cm, samica 26,5-30,8 cm

Masa ciała: samce 2,35-2,75 kg, samice 1,45-2,05 kg

Zamieszkuje tereny od wschodniego Tybetu do południowo-zachodniego Junanu, zwykle są to skaliste zbocza lasów iglastych i mieszanych do granicy śniegu na wysokościach 3000-4500 m n.p.m. W okresie zimowym schodzą do lasów w niższych rejonach. Tak jak wszystkie uszaki samce i samice ubarwione są jednakowo. W okresie lęgowym żyją w parach, przebywając w gęstych zaroślach (często różanecznikowych). Podczas żerowania wychodzą na otwartą przestrzeń, ale zawsze blisko krzewów. Kura składa 4-8 jaj i wysiaduje je przez 24-25 dni. Poza okresem rozrodczym tworzą niewielkie rodzinne stada.





uszek siwy

Crossoptilon auritum



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBLINIE

GRUDZIEŃ 2015

poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

STYCZEŃ 2016

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

uszak siwy

Crossoptilon auritum

Występuje w południowych Chinach na terenie prowincji Cinghaj oraz w północno-zachodniej części prowincji Syczuan. Zamieszkują tereny górskie na wysokości 1500-3800 m n.p.m. w rzadkich lasach sosnowych lub dębowych. W okresie poza lęgowym tworzą niewielkie stada, natomiast w okresie rozrodczym łączą się w pary, są ptakami monogamicznymi. Samica składa 5-12 jaj. Okres wysiadywania zwykle trwa 26-28 dni. Żywią się korzonkami, kłęczami, bulwami, owadami czy mięczakami przekopując podłoże dziobem, ziemią natomiast żywią się również pąkami drzew i krzewów. Prowadzą naziemny tryb życia, nocują na drzewach na wysokości około 4 m.

Długość ciała: samce 95 cm, samice 90 cm

Długość skrzydła: samiec 28,5-31,4 cm,
samica 28,3-31 cm

Masa ciała: samce 1,7-2,1 kg, samice 1,45-1,8 kg

