



# 2016

# PTAKI



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin

czubacz chełmiasty

## STYCZEŃ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 28           | 29     | 30    | 31       | 1      | 2      | 3         |
| 4            | 5      | 6     | 7        | 8      | 9      | 10        |
| 11           | 12     | 13    | 14       | 15     | 16     | 17        |
| 18           | 19     | 20    | 21       | 22     | 23     | 24        |
| 25           | 26     | 27    | 28       | 29     | 30     | 31        |

## LUTY 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |







samce i samice ubarwione są jednakowo

## CZUBACZ CHEŁMIASTY

łac. *Pauxi pauxi*

Nazywany jest również gderaczem. Zamieszkuje tropikalne lasy i ich obrzeża, gęste zarośla, często w pobliżu rzek, na wys. 500-2200 m n.p.m. Obie płcie ubarwione są w taki sam sposób. Samce są większe od samic. Gatunek zagrożony jest wyginięciem, w 2007 r. wielkość populacji oszacowano na 2,5 tys. szt. Występuje w północnej części Ameryki Południowej (północno-wschodnia Kolumbia i północno-zachodnia Wenezuela). Chętnie je nasiona, opadłe owoce, liście, kwiaty, czasem nawet drobne zwierzęta. Pisklęta odżywiają się także owadami. Podczas toków samiec wydaje dudniący dźwięk, co ułatwia mu wydłużona i pogrubiona tchawica. Wiosną samica składa 2-4 jaja. Młode latają po kilku godzinach od wyklucia.

|                | samce ♂      | samice ♀     |
|----------------|--------------|--------------|
| Długość ciała: | 85-92 cm     |              |
| Dł. skrzydła:  | 38,2-42,7 cm | 36,3-38,5 cm |
| Masa ciała:    | 3,5-3,75 kg  | 2,1-2,65 kg  |



## uszak biały

LUTY 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

MARZEC 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samce i samice ubarwione są jednakowo

## USZAK BIAŁY

łac. *Crossoptilon crossoptilon*

Jak wszystkie uszaki samce i samice tego gatunku ubarwione są jednakowo. Samica jest nieco mniejsza i nie posiada ostróg. W okresie lęgowym żyją w parach, przebywając w gęstych zaroślach. Podczas żerowania, przeważnie rano lub późnym popołudniem, wychodzą na otwartą przestrzeń, ale zawsze blisko krzewów lub ściany lasu. Podczas poszukiwania pokarmu ryją w ziemi przystosowanym do tego celu dziobem. Żywią się bulwami, korzonkami, nasionami, owadami i ich larwami, jagodami oraz różnymi częściami roślin, w tym młoda korą. W hodowli łatwo się osuwają, jednak w okresie godowym niektóre samce mogą przejawiać agresję. W środowisku naturalnym jest gatunkiem ginącym.

|                | samce ♂      | samice ♀     |
|----------------|--------------|--------------|
| Długość ciała: | 86-96 cm     |              |
| Dł. skrzydła:  | 27,2-39,5 cm | 26,5-30,8 cm |
| Masa ciała:    | 2,35-2,75 kg | 1,45-2,05 kg |

## kiściec tajwański

MARZEC 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 29           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |
| 7            | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13        |
| 14           | 15     | 16    | 17       | 18     | 19     | 20        |
| 21           | 22     | 23    | 24       | 25     | 26     | 27        |
| 28           | 29     | 30    | 31       | 1      | 2      | 3         |

KWIECIEŃ 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |

samiec kiśca tajwańskiego



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samica kiśca tajwańskiego

## KIŚCIEC TAJWAŃSKI

łac. *Lophura swinhoii*

W środowisku naturalnym gatunek ten jest endemiczny i występuje w centralnej części wyspy Tajwan. Szacuje się, że populacja żyjąca na wolności wynosi obecnie ponad 10 tys. szt., jednak pomimo wzrostu liczebności gatunek zaklasyfikowany jest jako zagrożony wyginięciem. W naturze jest to ptak monogamiczny, natomiast w hodowlach dopuszcza się trzymanie jednego samca z dwiema samicami. Zamieszkuje gęste lasy, często rosnące na zboczach, położone na wys. 200-2300 m n.p.m. Z ostatnich obserwacji wynika jednak, że ze względu na wycinkę lasów i zanik naturalnych siedlisk trudno go spotkać poniżej 1000 m n.p.m. Najczęściej widywane są w godzinach rannych i popołudniowych.

|                | samce ♂    | samice ♀   |
|----------------|------------|------------|
| Długość ciała: | ok. 79 cm  | ok. 50 cm  |
| Dł. skrzydła:  | 25-26 cm   | 24-24,5 cm |
| Masa ciała:    | ok. 1,1 kg |            |



modrzyk zwyczajny

## KWIECIEŃ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 28           | 29     | 30    | 31       | 1      | 2      | 3         |
| 4            | 5      | 6     | 7        | 8      | 9      | 10        |
| 11           | 12     | 13    | 14       | 15     | 16     | 17        |
| 18           | 19     | 20    | 21       | 22     | 23     | 24        |
| 25           | 26     | 27    | 28       | 29     | 30     | 1         |

## MAJ 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |







samce i samice ubarwione są jednakowo

## MODRZYK ZWYCZAJNY

*łac. Porphyrrio porphyrio*

Obie płcie są do siebie podobne, samica jest nieco mniejsza od samca. Podgatunek z wyspy Sameo nazywany jest przez miejscową ludność „manuali”, czyli „ptak przywódczy”. Charakteryzuje się dużą odwagą i determinacją, będąc w grupie potrafi zaatakować napastnika takiego jak np. gronostaj czy szczur. W momencie gdy jest zaniepokojony, pokazuje białe pióra znajdujące się pod ogonem. Dobrze pływa i nurkuje, choć robi to rzadko. Na liście Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) został uznany za gatunek najmniejszej troski. Zjada głównie pokarm roślinny - pędy, pąki, łodygi, liście oraz korzenie roślin wodnych. Czasem zjada owady, mięczaki, jaja, gryzonie czy ryby.

|                 | samce ♂    | samice ♀ |
|-----------------|------------|----------|
| Długość ciała:  | 42-50 cm   |          |
| Rozpiętość sk.: | 90-100 cm  |          |
| Masa ciała:     | 0,6-1,1 kg |          |



## argus malajski

MAJ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

samica argusa malajskiego

CZERWIEC 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samica argusa malajskiego

## **ARGUS MALAJSKI**

*łac. Argusianus argus*

Zamieszkują Półwysep Malajski, Wietnam, Borneo, południowo-zachodnią Tajlandię oraz Sumatrę. Wielkość populacji argusa malajskiego ma tendencję spadkową, w latach 1985-1997 liczebność tego bażanta zmniejszyła się o 25% w Malezji oraz 30% na Sumatrze. Powodem jest degradacja lasów na wyspach archipelagu malezyjskiego, kłusownictwo, zwłaszcza na Borneo. Nie jest znana dokładna liczba populacji i trwają badania w celu jej ustalenia. Argusy posiadają status podatnych na zagrożenie wymarciem, dlatego chroni je Konwencja Waszyngtońska (CITES). Ptaki te są w stanie przewidzieć trzęsienie ziemi na 1-2 dni przed jego nadejściem, wydają wtedy głośne dźwięki.

|                | samce ♂    | samice ♀   |
|----------------|------------|------------|
| Długość ciała: | 160-203 cm | 72-76 cm   |
| Dł. skrzydła:  | 80-100 cm  | 30-35 cm   |
| Masa ciała:    | 2-2,6 kg   | 1,5-1,7 kg |

gęś tybetańska

## CZERWIEC 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 30           | 31     | 1     | 2        | 3      | 4      | 5         |
| 6            | 7      | 8     | 9        | 10     | 11     | 12        |
| 13           | 14     | 15    | 16       | 17     | 18     | 19        |
| 20           | 21     | 22    | 23       | 24     | 25     | 26        |
| 27           | 28     | 29    | 30       | 1      | 2      | 3         |

## LIPIEC 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |







samce i samice ubarwione są jednakowo

## GĘŚ TYBETAŃSKA

*łac. Anser indicus*

Nazywana jest gęsią indyjską, wielkością dorównuje gęsi zbożowej. Zamieszkuje śródlądowe zbiorniki i ich brzegi w krajobrazie górskim. Samiec jest zwykle nieco większy od samicy, poza tym w upierzeniu brak dymorfizmu płciowego. Gęś tybetańska widywana jest w Tybecie na wys. nawet 5600 m n.p.m. Jest to najwyżej latający gatunek ptaka na świecie. W czasie wędrówek dwa razy w roku przelatuje przez Himalaje na wys. ok. 10 tys. m, czyli na tej samej wysokości, na jakiej latają samoloty pasażerskie. Obserwowano także stada przelatujące ponad Mount Everest. Przy takiej wysokości stężenie tlenu jest o połowę mniejsze niż na poziomie morza. Z tego względu krew gęsi ma specjalnie dostosowany skład.

|                 | samce ♂    | samice ♀ |
|-----------------|------------|----------|
| Długość ciała:  | 68-78 cm   |          |
| Rozpiętość sk.: | 120-150 cm |          |
| Masa ciała:     | 1,8-3,2 kg |          |



mandarynka

samce w szacie godowej

## LIPIEC 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 27           | 28     | 29    | 30       | 1      | 2      | 3         |
| 4            | 5      | 6     | 7        | 8      | 9      | 10        |
| 11           | 12     | 13    | 14       | 15     | 16     | 17        |
| 18           | 19     | 20    | 21       | 22     | 23     | 24        |
| 25           | 26     | 27    | 28       | 29     | 30     | 31        |

## SIERPIEŃ 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samiec w szacie spoczynkowej

## MANDARYNKA

*łac. Aix galericulata*

Zamieszkuje jeziora i rzeki, których brzegi porośnięte są wierzbami, szuwarami i innymi roślinami dającymi schronienie, w pobliżu lasów, do wys. 1500 m n.p.m. Jest to gatunek kaczki nadrzewnej, która zakłada gniazda w dziuplach drzew pochylonych nad wodą, w budkach lęgowych, rzadziej również na ziemi, pod osłoną pnia lub gęstej roślinności. Bardzo dobrze znoszą warunki zimowe panujące w Polsce, muszą mieć jedynie dostęp do niezamarzniętej wody. Mandarynki można spotkać np. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w liczbie ponad stu osobników. W Chinach są symbolem wierności, ponieważ łączą się w pary na całe życie. W okresie godowym samiec uzyskuje przepiękne kolory.

|                 | samce ♂   | samice ♀ |
|-----------------|-----------|----------|
| Długość ciała:  | 41-49 cm  |          |
| Rozpiętość sk.: | 65-75 cm  |          |
| Masa ciała:     | 430-690 g |          |



kulon

## SIERPIEŃ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 1            | 2      | 3     | 4        | 5      | 6      | 7         |
| 8            | 9      | 10    | 11       | 12     | 13     | 14        |
| 15           | 16     | 17    | 18       | 19     | 20     | 21        |
| 22           | 23     | 24    | 25       | 26     | 27     | 28        |
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## WRZESIEŃ 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samce i samice ubarwione są jednakowo

## KULON

łac. *Burhinus oedicnemus*

Występuje od Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego przez Bałkany po Ukrainę i Kaukaz. Podgatunki zamieszkują umiarkowaną strefę Europy, a także w Afryce i Azji, aż po równik. Zimuje w zachodnio-południowej Europie i Afryce. W Polsce występuje w dolinie Bugu i Narwi, jednak jest w kraju gatunkiem wymierającym. Przylatuje w kwietniu, a odlatuje od sierpnia do października. Żyją na nieużytkach, piaszczystych wydmach, wrzosowiskach i na suchych, porośniętych ubogą roślinnością terenach sąsiadujących ze starorzeczami. Najbardziej aktywne są od zmierzchu do świtu, ale aktywność w ciągu dnia też nie należy do rzadkości, choć łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć.

|                  | samce ♂   | samice ♀ |
|------------------|-----------|----------|
| Długość ciała:   | 40-45 cm  |          |
| Rozpiętość sk.:: | 75-85 cm  |          |
| Masa ciała:      | 350-500 g |          |



bazant himalajski

## WRZESIEŃ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |
| 5            | 6      | 7     | 8        | 9      | 10     | 11        |
| 12           | 13     | 14    | 15       | 16     | 17     | 18        |
| 19           | 20     | 21    | 22       | 23     | 24     | 25        |
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 1      | 2         |

## PAŹDZIERNIK 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

samica bązanta himalajskiego







samica (z przodu) i samiec bażanta himalajskiego

## BAŻANT HIMALAJSKI

*lac. Catreus wallichii*

Pochodzi z Himalajów, występuje w ich środkowej i zachodniej części, na terenie Nepalu, Indii (Kaszmir), Pakistanu, Chin (Tybet) i Bhutanu (miejscowo). Potocznie nazywany jest bażantem Walicha. Kury są mniejsze od samców, nie posiadają ostróg, mają mniejsze zaczerwienienie wokół oczu oraz mniejszy grzebień. Są gatunkiem monogamicznym i wytrzymałym na bardzo niskie temperatury. Cała populacja wynosi 4-6 tys. i ma tendencję spadkową, a gatunek zagrożony jest wyginięciem. W miejscach występowania bażanta himalajskiego utworzono parki narodowe, wprowadzono zakaz polowań oraz podejmowane są próby reintrodukcji. Żywią się m.in. bulwami, korzeniami, jagodami, owadami.

|                | samce ♂     | samice ♀     |
|----------------|-------------|--------------|
| Długość ciała: | 90-112 cm   | 61-67 cm     |
| Dł. skrzydła:  | 23,5-27 cm  | 22,5-24,5 cm |
| Masa ciała:    | 1,25-1,8 kg | 0,9-1,36 kg  |



bernikla białolica

## PAŹDZIERNIK 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 1      | 2         |
| 3            | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9         |
| 10           | 11     | 12    | 13       | 14     | 15     | 16        |
| 17           | 18     | 19    | 20       | 21     | 22     | 23        |
| 24           | 25     | 26    | 27       | 28     | 29     | 30        |
| 31           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |


## LISTOPAD 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolub.in.pl  /ParkLubin





samce i samice ubarwione są jednakowo

## BERNIKLA BIAŁOLICA

*łac. Branta leucopsis*

Jest to wędrowną gęś średniej wielkości. Zamieszkuje tereny przybrzeżnej tundry pokryte niską roślinnością, jeziora, rzeki lub wyspy na jeziorze. Na zimowiskach zajmuje łąki i pola położone blisko wybrzeży, z kamienistymi, stromymi stokami, często również na półkach skalnych nad brzegami wód, aby uchronić jaja przed lisem polarnym. Samiec nie różni się od samicy. Bernikle białolice są monogamiczne, łączą się w pary na całe życie. Gniazda zakładają we wschodniej Grenlandii, na Spitsberge, na południu Nowej Ziemi i w północnej części Norwegii. Od lat 70. także na płaskich, trawiastych wybrzeżach i wyspach Bałtyku. Zimują w basenie Morza Śródziemnego oraz na wybrzeżach Wysp Brytyjskich i Ameryki Płn.

|                 | samce ♂      | samice ♀ |
|-----------------|--------------|----------|
| Długość ciała:  | 55-70 cm     |          |
| Rozpiętość sk.: | 120-145 cm   |          |
| Masa ciała:     | 1,21-2,23 kg |          |

tragopan czerwony

## LISTOPAD 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 31           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |
| 7            | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13        |
| 14           | 15     | 16    | 17       | 18     | 19     | 20        |
| 21           | 22     | 23    | 24       | 25     | 26     | 27        |
| 28           | 29     | 30    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## GRUDZIEŃ 2016

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  |

samiec tragopana czerwonego



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samiec tragopana czerwonego

## TRAGOPAN CZERWONY

*łac. Tragopan satyra*

Występują w Himalajach, Tybecie, Nepalu, a także w Chinach. Odżywiają się głównie zielonymi częściami roślin, owocami, nasionami, owadami i ich larwami. Gniazduje przeważnie na ziemi, niekiedy na skałach i w opuszczonych gniazdach innych ptaków. Samice są mniejsze od samców i różnią się upierzeniem. Są to bardzo spokojne bażanty, nie przejawiają agresji nawet wobec innych samców będących w pobliżu. Zasiedlają głównie lasy dębowe, rododendronowe z gęstymi zaroślami i bambusem, lasy mieszane i porośnięte roślinnością wąwozy na wys. 2500-4500 m n.p.m. W zimowych miesiącach w poszukiwaniu pokarmu schodzi w niższe partie gór (ok. 1800 m n.p.m.).

|                  | samce ♂    | samice ♀  |
|------------------|------------|-----------|
| Długość ciała:   | 67-72 cm   | ok. 60 cm |
| Rozpiętość sk.:: | 75-82 cm   |           |
| Masa ciała:      | 1,6-2,1 kg | 1-1,2 kg  |



bernikla rdzawoszyja

## GRUDZIEŃ 2016

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 28           | 29     | 30    | 1        | 2      | 3      | 4         |
| 5            | 6      | 7     | 8        | 9      | 10     | 11        |
| 12           | 13     | 14    | 15       | 16     | 17     | 18        |
| 19           | 20     | 21    | 22       | 23     | 24     | 25        |
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 31     | 1         |

## STYCZEŃ 2017

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin





samce i samice ubarwione są jednakowo

## BERNIKLA RDZAWOSZYJA

*łac. Branta ruficollis*

W Polsce pojawia się na przelotach często włączana w stada bernikli białoliciej. Dawniej była gatunkiem bardzo rzadko zalatującym do Polski, natomiast od 2005 r. średnia liczba stwierdzeń wzrosła do 20 w ciągu roku (wcześniej wynosiła 4). Najczęściej obserwowane były w zachodniej części Polski, na Śląsku oraz w Wielkopolsce. Gatunek ten jest chroniony, wymieniony w dyrektywie ptasiej. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych wpisany jako zagrożony wyginięciem. Jest to jedna z najmniejszych i najładniejszych bernikli. Ubarwienie samca i samicy niczym się nie różni, gąsior jest jedynie nieco większy od gęsi. Zjada pokarm roślinny, młodą trawę, kłaczka, cebulki czy nasiona.

|                  | samce ♂    | samice ♀ |
|------------------|------------|----------|
| Długość ciała:   | 53-60 cm   |          |
| Rozpiętość sk.:: | 110-125 cm |          |
| Masa ciała:      | 1-1,5 kg   |          |



## orzeł stepowy

STYCZEŃ 2017

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 31     | 1         |
| 2            | 3      | 4     | 5        | 6      | 7      | 8         |
| 9            | 10     | 11    | 12       | 13     | 14     | 15        |
| 16           | 17     | 18    | 19       | 20     | 21     | 22        |
| 23           | 24     | 25    | 26       | 27     | 28     | 29        |
| 30           | 31     | 1     | 2        | 3      | 4      | 5         |

LUTY 2017

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

fotografia: A. Łużyński, oprac. graficzne: A. Bończak  
samce i samice ubarwione są jednakowo



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin