



# 2018

# PTAKI ZOO LUBIN



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE  
parki-lubina.pl • zoolubin.pl  /ParkLubin



uszak biały, os. dorosły, łac. *Crossoptilon c. drouyni*

## STYCZEŃ 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 1            | 2      | 3     | 4        | 5      | 6      | 7         |
| 8            | 9      | 10    | 11       | 12     | 13     | 14        |
| 15           | 16     | 17    | 18       | 19     | 20     | 21        |
| 22           | 23     | 24    | 25       | 26     | 27     | 28        |
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## LUTY 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4  |







uszak biały, pisklę/os. dorosły, łac. *Crossoptilon c. drouyni*

## USZAK BIAŁY

łac. *Crossoptilon c. drouyni*

Jak u wszystkich uszaków samce i samice uszaka białego ubarwione są jednakowo. W naturze występują w prześwietlonych lasach z gęstym podszytem, na wysokości 3000-4500 m n.p.m., od wschodniego Tybetu do południowo-zachodniego Junanu. Zamieszkują także zachodni Syczuan oraz południowy Qinghai. W okresie zimowym łączą się w większe grupy i schodzą do lasów w niższych rejonach. Żywią się bulwami, korzonkami, nasionami, owadami i ich larwami, jagodami oraz różnymi częściami roślin, w tym młodą korą. Pokarm pozyskują ryjąc w ziemi dziobem, który jest do tego przystosowany i wyjątkowo mocny. W hodowli oswajają się dość łatwo, jednak w okresie lęgowym mogą być agresywne.

|                | samce ♂      | samice ♀     |
|----------------|--------------|--------------|
| Długość ciała: | 86-96 cm     |              |
| Dł. skrzydła:  | 27,2-39,5 cm | 26,5-30,8 cm |
| Masa ciała:    | 2,35-2,75 kg | 1,45-2,05 kg |



kiściec srebrzysty, samiec, łac. *Lophura nympha*

## LUTY 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |
| 5            | 6      | 7     | 8        | 9      | 10     | 11        |
| 12           | 13     | 14    | 15       | 16     | 17     | 18        |
| 19           | 20     | 21    | 22       | 23     | 24     | 25        |
| 26           | 27     | 28    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## MARZEC 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  |







kiściec srebrzysty, samiec/samica, łac. *Lophura nycthemera*

## KIŚCIEC SREBRZYSTY

łac. *Lophura nycthemera*

W środowisku naturalnym występuje w południowo-wschodniej Azji i w Chinach. Odżywia się nasionami, owadami, zielonymi częściami roślin, korzonkami, jagodami czy wygrzebanymi z ziemi cebulkami. Samce są poligamiczne, kojarzą się z 3-4 samicami, wobec których bywają agresywne. Okres lęgowy zaczyna się już pod koniec lutego i trwa do maja. Młode po wykluciu wodzi samiec wraz z samicami. Pisklęta rosną bardzo szybko i już po paru dniach zdolne są do latania. Samice osiągają dojrzałość płciową po roku, a samce po dwóch latach. W Chinach gatunek ten był znany i hodowany od najdawniejszych czasów, jego wizerunek występował w sztuce, a w literaturze porównywano go z feniksem.

|                | samce ♂      | samice ♀  |
|----------------|--------------|-----------|
| Długość ciała: | ok. 125 cm   | ok. 65 cm |
| Dł. skrzydła:  | 22,5-30,5 cm | 15-27 cm  |
| Masa ciała:    | 1,1-2 kg     | 1-1,3 kg  |



kur bankiwa, samiec, łac. *Gallus gallus gallus*

## MARZEC 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 26           | 27     | 28    | 1        | 2      | 3      | 4         |
| 5            | 6      | 7     | 8        | 9      | 10     | 11        |
| 12           | 13     | 14    | 15       | 16     | 17     | 18        |
| 19           | 20     | 21    | 22       | 23     | 24     | 25        |
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 31     | 1         |

## KWIECIEŃ 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |







kur bankiwa, piskle/samica, lac. *Gallus gallus gallus*

## KUR BANKIWA

lac. *Gallus gallus gallus*

Kur bankiwa jest uważany za przodka kury domowej, która została udomowiona już 4000 lat p.n.e. W środowisku naturalnym występuje na terenie południowo-wschodniej Azji, od Pakistanu i Indii na zachód i południe przez Sumatrę i Indonezję. Zamieszkuje zróżnicowane środowisko, większość typów obszarów leśnych, a także obrzeża pól, gaje czy busze. Na wolności gatunek uważany jest za dość popularny i szeroko rozpowszechniony, ale możliwe jest, że duży odsetek ptaków wymieszał się ze dziedziczącymi udomowionymi kurczakami. Okres rozrodczy zaczyna się w marcu i trwa do czerwca. Samica składa przeciętnie 5-6 jaj, a okres inkubacji wynosi 18-21 dni.

|                | samce ♂         | samice ♀         |
|----------------|-----------------|------------------|
| Długość ciała: | 65-68 cm        | 41-46 cm         |
| Dł. skrzydła:  | ok. 30 cm       | ok. 25 cm        |
| Masa ciała:    | ok. 0,6-1,45 kg | ok. 0,45-1,05 kg |



*tragopan Temmincka, samica, łac. Tragopan temminckii*

## KWIECIEŃ 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 31     | 1         |
| 2            | 3      | 4     | 5        | 6      | 7      | 8         |
| 9            | 10     | 11    | 12       | 13     | 14     | 15        |
| 16           | 17     | 18    | 19       | 20     | 21     | 22        |
| 23           | 24     | 25    | 26       | 27     | 28     | 29        |
| 30           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |

## MAJ 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |





tragopan Temmincka, samiec, łac. *Tragopan temminckii*

## TRAGOPAN TEMMINCKA

łac. *Tragopan temminckii*

Inaczej zwany tragopanem modrolicym. Jest najmniej zagrożony ze wszystkich tragopanów, jednak przez wielu hodowców uważany za najpiękniejszego. W trakcie godów samce nadymają barwne, jaskrawe worki skórne na szyi, przez co toki są wyjątkowo widowiskowe. Zamieszkuje wilgotne, chłodne, wysokogórskie lasy na wysokości 1000-3600 m n.p.m. Prowadzi skryty i nadržewny tryb życia. Gniazdo zakłada przeważnie na drzewach lub półkach skalnych, często zajmuje też gniazda innych ptaków, z których pisklęta wyskakują po wyschnięciu. Tragopany jako jedyne z bażantów nie zakładają gniazda na ziemi. Samica składa od 2 do 6 jaj, które wysiaduje przez 28 dni.

|                  | samce ♂      | samice ♀    |
|------------------|--------------|-------------|
| Długość ciała:   | ok. 65 cm    | ok. 58 cm   |
| Rozpiętość sk.:: | 68-75 cm     |             |
| Masa ciała:      | 1,35-1,45 kg | 0,9-1,05 kg |



kiściec syjamski, samica, łac. *Lophura diardi*

## MAJ 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 30           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |
| 7            | 8      | 9     | 10       | 11     | 12     | 13        |
| 14           | 15     | 16    | 17       | 18     | 19     | 20        |
| 21           | 22     | 23    | 24       | 25     | 26     | 27        |
| 28           | 29     | 30    | 31       | 1      | 2      | 3         |

## CZERWIEC 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |







kiściec syjamski, samiec, *lac. Lophura diardi*

## KIŚCIEC SYJAMSKI

*lac. Lophura diardi*

Zamieszkują Birnę, Tajlandię, Kambodę, Laos i południowy Wietnam. Żyją głównie w lasach z gęstym podszytem roślinności mniejszej i w bambusowych zaroślach na wysokości 700-1150 m n.p.m. oraz na polach uprawnych. Żerują wcześnie rano lub późnym popołudniem, w niewielkich grupach, na otwartych terenach, jednak zawsze w pobliżu krzewów, wśród których mogą szybko się ukryć. Przed okresem lęgowym łączą się w pary, w pozostałym czasie żyją samotnie. Między samcem a samicą występuje mocny dymorfizm płciowy, mimo tego są to bażanty monogamiczne. Dziko żyjącą populację szacuje się obecnie na ok. 10 tys. osobników z tendencją spadkową (z powodu nielegalnych polowań i wycinki lasów).

|                | samce ♂     | samice ♀       |
|----------------|-------------|----------------|
| Długość ciała: | ok. 80 cm   | ok. 60 cm      |
| Dł. skrzydła:  | 22-24 cm    | 20-22 cm       |
| Masa ciała:    | ok. 1,42 kg | ok. 0,9-1,1 kg |



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE • [zoolubin.pl](http://zoolubin.pl) [f /ParkLubin](https://www.facebook.com/ParkLubin)

ołśniak himalajski, samiec, łac. *Lophophorus impejanus*

## CZERWIEC 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 28           | 29     | 30    | 31       | 1      | 2      | 3         |
| 4            | 5      | 6     | 7        | 8      | 9      | 10        |
| 11           | 12     | 13    | 14       | 15     | 16     | 17        |
| 18           | 19     | 20    | 21       | 22     | 23     | 24        |
| 25           | 26     | 27    | 28       | 29     | 30     | 1         |

## LIPIEC 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |





olśniak himalajski, samiec/samica, łac. *Lophophorus impejanus*

## OLŚNIAK HIMALAJSKI

łac. *Lophophorus impejanus*

Występuje od wschodniego Afganistanu do zachodnich Chin, w Himalajach, północnych Indiach i Nepalu. Zjada różne części roślin (dorośle ptaki zjadają duże ilości zieleniny), korzonki, bezkręgowce czy cebulki wykopane z ziemi masywnym dziobem. Z reguły jest to ptak poligamiczny, jednak zdarzają się częste przypadki łączenia par na całe życie. Okres lęgowy zaczyna się w kwietniu i trwa do sierpnia. Samica w dołku wykopanym w ziemi, często w pobliżu krzewów, składa 5-12 jaj i wysiaduje przez 28 dni. Po wykluciu rodzice opiekują się młodymi jeszcze przez 6 miesięcy, potem stają się całkowicie niezależne. Dojrzałość płciową osiągają w wieku dwóch lat. Żyją 10-12 lat, w niewoli do 25 lat.

|                | samce ♂      | samice ♀    |
|----------------|--------------|-------------|
| Długość ciała: | ok. 64-72 cm |             |
| Dł. skrzydła:  | 29-32 cm     | 26-29 cm    |
| Masa ciała:    | 1,98-2,38 kg | 1,8-2,15 kg |



bażant birmański, samica, łac. *Syrnaticus himalaicus*

## LIPIEC 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 25           | 26     | 27    | 28       | 29     | 30     | 1         |
| 2            | 3      | 4     | 5        | 6      | 7      | 8         |
| 9            | 10     | 11    | 12       | 13     | 14     | 15        |
| 16           | 17     | 18    | 19       | 20     | 21     | 22        |
| 23           | 24     | 25    | 26       | 27     | 28     | 29        |
| 30           | 31     | 1     | 2        | 3      | 4      | 5         |

## SIERPIEŃ 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |







bażant birmański, samica/samiec, łac. *Symnaticus himalaicus*

## BAŻANT BIRMAŃSKI

łac. *Symnaticus himalaicus*

Występuje w południowo-zachodnich Chinach, północnej Birmie, Indiach i Tajlandii. Zamieszkuje otwarte, suche lasy (głównie dębowe i sosnowe), przerywane zaroślami i trawiastymi polanami, strome zbocza skalne do wysokości 300 m n.p.m. Zjada nasiona, zielone części roślin, jagody czy drobne bezkręgowce. Poza okresem lęgowym tworzy nieduże stada składające się często z osobników jednej płci. Jest odporny na wysokie temperatury. Podobnie jak w przypadku wielu innych bażantów jego liczebność w Azji Wschodniej ciągle maleje w wyniku utraty siedlisk spowodowanej intensyfikacją rolnictwa. Zagrożeniem dla gatunku są także częste polowania organizowane przez górskie plemiona.

|                | samce ♂      | samice ♀     |
|----------------|--------------|--------------|
| Długość ciała: | ok. 90 cm    | ok. 60 cm    |
| Dł. skrzydła:  | 20,5-22,5 cm | 20-21 cm     |
| Masa ciała:    | 0,9-1,1 kg   | 0,65-0,85 kg |



bażant łowny, samiec, łac. *Phasianus colchicus*

## SIERPIEŃ 2018


| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 30           | 31     | 1     | 2        | 3      | 4      | 5         |
| 6            | 7      | 8     | 9        | 10     | 11     | 12        |
| 13           | 14     | 15    | 16       | 17     | 18     | 19        |
| 20           | 21     | 22    | 23       | 24     | 25     | 26        |
| 27           | 28     | 29    | 30       | 31     | 1      | 2         |

## WRZESIEŃ 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |







bażant łowny, samiec/samica, łac. *Phasianus colchicus*

## BAŻANT ŁOWNY

łac. *Phasianus colchicus*

Gatunek introdukowany w Europie, Ameryce Północnej, Tasmanii i Nowej Zelandii. Dzikie populacje żyją na wschód od Morza Czarnego oraz na Kaukazie i dalej na wschód, aż do Chin. W Polsce pierwsze introdukcje odbywały się na Śląsku w latach 60. XVI w., natomiast na Pomorzu i Mazurach bażant pojawił się dopiero w połowie XIX w. Zimą i po zbiorze zbóż zjada głównie pokarm roślinny, latem owoce leśne i nasiona, korzonki, ziarna chwastów i zbóż oraz duże ilości owadów. Czasem pokarmem mogą być nawet małe żaby, jaszczurki, gryzonie, małe ryby i padlina. Podobnie jak większość ptaków grzebiących młode odżywiają się głównie wysokobiałkowym pokarmem w postaci owadów, ich larw i jaj.

|                | samce ♂      | samice ♀   |
|----------------|--------------|------------|
| Długość ciała: | 70-90 cm     | 50-60 cm   |
| Dł. skrzydła:  | 23,8-25,8 cm | 21-22 cm   |
| Masa ciała:    | 0,75-1,9 kg  | 0,6-1,4 kg |



kiściec tajwański, samiec, łac. *Lophura swinhoii*

## WRZESIEŃ 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 27           | 28     | 29    | 30       | 31     | 1      | 2         |
| 3            | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9         |
| 10           | 11     | 12    | 13       | 14     | 15     | 16        |
| 17           | 18     | 19    | 20       | 21     | 22     | 23        |
| 24           | 25     | 26    | 27       | 28     | 29     | 30        |

## PAŹDZIERNIK 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |







kiściec tajwański, os. młody/samica, łac. *Lophura swinhoii*

## KIŚCIEC TAJWAŃSKI

łac. *Lophura swinhoii*

Występuje w centralnej części wyspy Tajwan (gatunek endemiczny). Zamieszkuje gęste lasy, często rosnące na zboczach, na wysokości 200-2300 m n.p.m. Z ostatnich obserwacji wynika jednak, że trudno go spotkać poniżej 1000 m n.p.m., co spowodowane jest wycinką lasów i zanikiem naturalnych siedlisk. Najczęściej widywane są w godzinach rannych i popołudniowych, zwłaszcza podczas mgły, gdy widoczność jest niska. Żerują na ziemi pod baldachimem gęstych krzewów i drzew, rzadziej widywne są wzdłuż szlaków leśnych lub na łąkach i polach bezpośrednio graniczących ze ścianą lasu. Noce spędzają na gałęziach drzew. Poza okresem lęgowym żyją samotnie. Unikają kontaktu z człowiekiem.

|                | samce ♂    | samice ♀   |
|----------------|------------|------------|
| Długość ciała: | ok. 79 cm  | ok. 50 cm  |
| Dł. skrzydła:  | 25-26 cm   | 24-24,5 cm |
| Masa ciała:    | ok. 1,1 kg |            |



bażant królewski, samiec, łac. *Syrmaticus reevesii*

## PAŹDZIERNIK 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 1            | 2      | 3     | 4        | 5      | 6      | 7         |
| 8            | 9      | 10    | 11       | 12     | 13     | 14        |
| 15           | 16     | 17    | 18       | 19     | 20     | 21        |
| 22           | 23     | 24    | 25       | 26     | 27     | 28        |
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## LISTOPAD 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |







bażant królewski, samica/samiec, *lac. Syrmaticus reevesii*

## BAŻANT KRÓLEWSKI

*lac. Syrmaticus reevesii*

Zamieszkuje lasy mieszane i liściaste z podszyciem krzewiastym, na wyżynach i w górach na wysokości 300-2000 m n.p.m. Występuje w środkowej i północnej części Chin. Preferuje pokarm roślinny, owoce, zielone części roślin, nasiona, żółędzie, a także owady, ślimaki oraz dżdżownice. Owoce zjada bezpośrednio z krzewu, a dużą część pożywienia poszukuje rozgrzebując nogami ziemię. Jest największym z długoogoniastych bażantów. W środowisku naturalnym żyje w niewielkich, rodzinnych grupkach, natomiast w okresie lęgowym każdy kogut oddziela się od stada z jedną lub dwiema samicami w poszukiwaniu własnego rewiru. Noce spędza w koronach drzew, choć nie jest zbyt sprawny w locie. Odporny na zimno.

|                | samce ♂                     | samice ♀                  |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Długość ciała: | 200 cm<br>w tym ogon 160 cm | 75 cm<br>w tym ogon 40 cm |
| Dł. skrzydła:  | 27,5-30 cm                  | 23,5-25 cm                |
| Masa ciała:    | ok. 1,5 kg                  | ok. 0,95 kg               |



bażant himalajski, samiec, łac. *Catreus wallichii*

## LISTOPAD 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |
| 5            | 6      | 7     | 8        | 9      | 10     | 11        |
| 12           | 13     | 14    | 15       | 16     | 17     | 18        |
| 19           | 20     | 21    | 22       | 23     | 24     | 25        |
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 1      | 2         |

## GRUDZIEŃ 2018

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |







bażant himalajski, piskle/samica, łac. *Catreus wallichii*

## BAŻANT HIMALAJSKI

łac. *Catreus wallichii*

Gatunek pochodzi z terenu środkowych oraz wschodnich Himalajów, spotkać go można na terenie Nepalu, Indii (Kaszmir), Pakistanu, Chin (Tybet) i Bhutanu. Pokarm stanowią głównie bulwy, korzonki, jagody oraz owady i ich larwy. Wiosną to przede wszystkim zielone części roślin. W środowisku naturalnym gatunek zagrożony jest wyginięciem. W miejscach występowania bażanta himalajskiego utworzono parki narodowe, wprowadzono zakaz polowań oraz podejmowane są próby reintrodukcji. Samiec bardzo głośno tokuje, wydawany przez niego dźwięk rozchodzi się nawet na odległość dwóch kilometrów. W tym okresie koguty są agresywne w stosunku do ludzi, ale nie przejawiają agresji wobec samic.

|                | samce ♂     | samice ♀     |
|----------------|-------------|--------------|
| Długość ciała: | 90-112 cm   | 61-67 cm     |
| Dł. skrzydła:  | 23,5-27 cm  | 22,5-24,5 cm |
| Masa ciała:    | 1,25-1,8 kg | 0,9-1,36 kg  |



kiściec nepalski, samiec, łac. *Lophura leucomelanos*

## GRUDZIEŃ 2018

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 26           | 27     | 28    | 29       | 30     | 1      | 2         |
| 3            | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9         |
| 10           | 11     | 12    | 13       | 14     | 15     | 16        |
| 17           | 18     | 19    | 20       | 21     | 22     | 23        |
| 24           | 25     | 26    | 27       | 28     | 29     | 30        |
| 31           | 1      | 2     | 3        | 4      | 5      | 6         |

## STYCZEŃ 2019

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  |







kiściec nepalski, pisklę/samica, łac. *Lophura leucomelanos*

## KIŚCIEC NEPAJSKI

łac. *Lophura leucomelanos*

Tworzy aż 9 podgatunków, zasiedlając głównie rejony górskie od 300 do 3350 m n.p.m. Dzielą się na dwie grupy nepali wschodnich, które zajmują niziny i pola oraz nepali zachodnich osiadłych w lasach. Zimą schodzą w niższe rejony w celu poszukiwania pokarmu. Mimo znacznego dymorfizmu jest to gatunek monogamiczny. W hodowlach zdarza się, że kogut żyje z dwiema samicami. Gatunek uważany jest za niezagrożony wyginięciem, jednak nieustannie zmniejsza się obszar jego występowania ze względu na wycinanie lasów oraz powiększanie terenów rolniczych. Ptaki te żywią się nasionami, jagodami, bezkręgowcami czy zielonymi częściami roślin, np. różaneczników występujących w ich naturalnym środowisku.

|                | samce ♂    | samice ♀     |
|----------------|------------|--------------|
| Długość ciała: | 63-74 cm   | 50-60 cm     |
| Dł. skrzydła:  | 21-29,5 cm | 19,8-23,5 cm |
| Masa jaja:     | 0,8-1,2 kg | 0,7-1,14 kg  |

fotografia: A. Łużyński, oprac. graf.: A. Bończak



CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE • [zoolubin.pl](http://zoolubin.pl) [f /ParkLubin](https://www.facebook.com/ParkLubin)



bażant złocisty, samiec, łac. *Chrysolophus pictus*

## STYCZEŃ 2019

| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|--------------|--------|-------|----------|--------|--------|-----------|
| 1            | 2      | 3     | 4        | 5      | 6      | 7         |
| 8            | 9      | 10    | 11       | 12     | 13     | 14        |
| 15           | 16     | 17    | 18       | 19     | 20     | 21        |
| 22           | 23     | 24    | 25       | 26     | 27     | 28        |
| 29           | 30     | 31    | 1        | 2      | 3      | 4         |

## LUTY 2019

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1  | 2  | 3  | 4  |