









Portrety ptaków / wystawa fotografii

W lubińskiej ptaszarni podziwiać można kilkadziesiąt gatunków rzadkich ptaków Polski i świata. Wizyta w ptaszarni jest szczególną okazją do obejrzenia ptaków, które urzekają upierzeniem, a także przyjrzenia się okazom gatunków skrytych i trudnych do obserwacji w naturze. Wystawa składa się z fotografii prezentujących różne gatunki ptaków. Niektóre z nich można obejrzeć w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.

**PARK
WROCŁAWSKI**
parki-lubina.pl

Centrum
Edukacji
Przyrodniczej
w Lubinie





PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Bielik / *Haliaeetus albicilla*

Bieliki zasiedlają północno-wschodnie regiony Europy oraz wybrzeża morskie, pojezierza i doliny dużych rzek, wschodnie wybrzeże Grenlandii, wschodnią Azję oraz tereny położone na północ od Himalajów. W Polsce bielik spotykany jest na całym niżu, ale głównie na północy oraz zachodzie kraju.

Długość ciała: 75-90 cm
Rozpiętość skrzydeł: 200-250 cm

Masa ciała: samce 3,1-5,4 kg
samice 4,1-6,9 kg

Żywi się dużymi rybami (leszcze, karpie, szczupaki, płocie), ptakami wodnymi (łyskami, kaczkami, perkozami), zającami, królikami oraz padliną.



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Puchacz / Bubo bubo

Na dietę puchacza składają się głównie szczury, myszy, króliki, zające, krety, gołębie, krukowate, ptaki wodne, młode lisy, młode sarny.

Zasiedla lasy i góry umiarkowanej strefy klimatycznej Eurazji (bez Wysp Brytyjskich i północy Francji), jest ptakiem osiadłym. Występuje w rozproszeniu, nielicznie i lokalnie. W Polsce gniazduje głównie na północy i południu. Ilość szacuje się na 250 par w całym kraju z tendencją wzrostową.

Długość ciała: 60-75 cm
Rozpiętość skrzydeł: 160-180 cm

Masa ciała: samce 1,5-2,5 kg
samice 1,75-4 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Olśniak himalajski / *Lophophorus impejanus*

Żywi się nasionami oraz bezkręgowcami. W zimie kopie w śniegu w poszukiwaniu korzeni, bulw i innych części roślin.

Dorosłe koguty są ubarwione bogato i metalicznie. Dorosłe kury, jak w przypadku innych gatunków rodziny kurowatych, upierzone są skromnie, w kolorach rdzawobrazowym, białym i czarnym. Grzebień kur jest krótszy niż w przypadku kogutów. Takie upierzenie jest przejawem znacznego dymorfizmu płciowego.

Długość ciała: 60-70 cm
Rozpiętość skrzydeł: 60-75 cm

Masa ciała: samce 1,9-2,4 kg
samice 1,8-2,1 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Olśniak himalajski / *Lophophorus impejanus*

Żywi się nasionami oraz bezkręgowcami. W zimie kopie w śniegu w poszukiwaniu korzeni, bulw i innych części roślin.

Olśniaki himalajskie występują w Azji, od wschodniego Afganistanu przez Himalaje, w tym Kaszmir, północne Indie, Nepal, południowy Tybet i Butan. Nazwa łacińska tego gatunku upamiętnia Lady Mary Impey, małżonkę prezesa brytyjskiego sądu najwyższego Bengalu, sir Eljaha Impey.

Długość ciała: 60-70 cm
Rozpiętość skrzydeł: 60-75 cm

Masa ciała: samce 1,9-2,4 kg
samice 1,8-2,1 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Płaskonos / *Spatula clypeata*

Żywi się fito- i zooplanktonem zbieranym przy dnie za pomocą wyspecjalizowanego dzioba. Często żeruje nocą.

Zamieszkuje Eurazję poza północnymi skrajami i basenem Morza Śródziemnego oraz Amerykę Północną. Zimuje w południowej Europie nad Morzem Śródziemnym, północnej i środkowej Afryce oraz jej atlantyckich wybrzeżach, południowej Azji i Ameryce Południowej. W Polsce nielicznie gnieździ się na całym niżu.

Długość ciała: 43-52 cm
Rozpiętość skrzydeł: 69-85 cm

Masa ciała: samce 500-850 g
samice 410-780 g



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Bażant złocisty / *Chrysolophus pictus*

Żywi się głównie pędami bambusa, owadami, żdźbłami traw oraz bezkręgowcami.

Występuje w wysokogórskich lasach środkowej i zachodniej części Chin na wysokości 2000 m n.p.m. W Wielkiej Brytanii tworzy kilka oddzielnych populacji. To jeden z bażantów najwcześniej sprowadzonych do Europy. Choć źródła różnie podają wiadomo, że nastąpiło to między XVII a XVIII wiekiem.

Długość ciała: 60-105 cm
Rozpiętość skrzydeł: 65-76 cm

Masa ciała: samce ok. 1 kg
samice ok. 0,7 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Puszczyk mszarny / *Strix nebulosa*

Żywi się nornikami, które wypatruje z czatowni, drobnymi ssakami i średnimi ptakami. Poluje również na ofiary poruszające się pod śniegiem.

Puszczyk mszarny zamieszkuje północno-wschodnią Europę, środkowy pas Azji oraz północną część Ameryki Północnej. Populacje euroazjatyckie prowadzą osiadły tryb życia, natomiast amerykańskie wędrują w rejony środka kontynentu. W Polsce znajduje się tylko kilka lub kilkanaście par lęgowych tego pięknego ptaka.

Długość ciała: 59-70 cm
Rozpiętość skrzydeł: 127-148 cm

Masa ciała: 900-1200 g



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Puszczyk uralski / *Strix uralensis*

Zjadają drobne ptaki (w tym również sowy), norniki, żaby i owady, które wypatrują z niskiej czatowni.

Puszczyki uralskie zamieszkują lasy północno-wschodniej Europy i północnej Azji, z wyjątkiem północnych krańców kontynentów. W Europie występują dwa wyspowe siedliska, na południu Alp i na północy Karpat. W Polsce gniazdują w starych lasach Karpat i Tatr oraz w północno-wschodniej części Mazur i w Białowieży.

Długość ciała: 50-60 cm
Rozpiętość skrzydeł: 125-130 cm

Masa ciała: samce 0,5-0,9 kg
samice 0,6-1,3 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Uszak siwy / *Crossoptilon auritum*

Przeważnie odżywia się różnymi częściami roślin, owocami, nasionami i wieloma gatunkami drobnych owadów.

W warunkach naturalnych występuje tylko w Chinach, zamieszkuje lasy iglaste do wysokości 3500 m n.p.m. Obecnie jest niezagrożonym, najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem ze swego rodzaju. Góra głowy pokryta jest aksamitnymi czarnymi piórami, tzw. „uszy” są białe i wychodzą spod podbródka i ciągną się aż za uszy.

Długość ciała: 75-98 cm
Rozpiętość skrzydeł: 68-85 cm

Masa ciała: 1,5-2 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Żuraw mandżurski / *Grus japonensis*

Żurawie żywią się małymi płazami, owadami, roślinami oraz wodnymi bezkręgowcami.

Zamieszkuje tereny Niziny Mandżurskiej (północno-wschodnie Chiny i południowo-wschodnia Rosja). Zimuje w Korei, wschodnich Chinach, na Tajwanie. Populacja osiadła zamieszkuje wyspę Hokkaido. W ostatnich dekadach liczba ptaków w Japonii wyraźnie spadła, lecz ratowanie gatunku daje coraz lepsze efekty.

Długość ciała: 1,5 m
Rozpiętość skrzydeł: 2,2-2,5 m

Masa ciała: 7-12 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Batalion / *Philomachus pugnax*

Ich pokarm stanowią owady i ich larwy, dżdżownice, wodne skorupiaki, ślimaki, glony oraz nasiona.

Północna Europa i Azja. Lokalnie występują także w Azji centralnej. Zimują na wybrzeżach Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie i w Indiach, a także w wielu rejonach Afryki. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym. Do Polski przylatują od końca marca do maja, a odlatują od połowy lipca do października.

Długość ciała: 20-30 cm
Rozpiętość skrzydeł: 50-55 cm

Masa ciała: samce 0,15-0,2 kg
samice 0,07-0,17 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Kraska / *Coracias garrulus*

Zjada głównie chrząszcze, świerszcze, szarańczaki, żuki gnojowe, dżdżownice, żaby, jaszczurki, małe węże i młode ptaki.

Kraska zasiedla środkową, wschodnią i południową Europę oraz północno-zachodni pas wybrzeża Afryki. Zimuje głównie w Afryce na południe od równika. W Polsce kraski występują we wschodniej części kraju, głównie na Podlasiu, Rostoczu, Kielecczyźnie, Równinie Kurpiowskiej i Mazurskiej.

Długość ciała: 31-32 cm
Rozpiętość skrzydeł: ok. 55 cm

Masa ciała: 120-150 g



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Hełmiatka / *Netta rufina*

Zamieszkuje południową część krainy palearktycznej od Półwyspu Iberyjskiego po Azję Środkową. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i południowej Azji, dokąd odlatuje od września do listopada. Od końca XX w. coraz częściej występuje w Europie. W Polsce nielicznie gniazduje na Mazurach, w innych rejonach rzadka.

Długość ciała: 53-57 cm
Rozpiętość skrzydeł: 72-82 cm

Zielone części roślin wodnych z niewielką ilością pokarmu zwierzęcego, pączki, młode pędy, kłącza, nasiona, ale też mięczaki, skorupiaki i owady.

Masa ciała: 0,8-1,5 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Paw zwyczajny / *Pavo cristatus*

W zasadzie wszystkożerny, zjada nasiona, pędy, owoce, bezkręgowce, małe gryzonie, gady, a nawet jadowite węże.

Zamieszkuje Indie, Ceylon, Pakistan, Jawę, Sri Lankę, Nepal. W wielu miejscach na świecie dziczące ptaki utworzyły wyspowe populacje. Narodowy ptak Indii. Należy do rodziny bażantowatych i prawdopodobnie jest najwcześniej udomowionym ptakiem ozdobnym. Znany był w krajach śródziemnomorskich już 3 tys. lat temu.

Długość ciała: 80-230 cm
Rozpiętość skrzydeł: 120-160 cm

Masa ciała: samiec 3,75-6 kg
samica 2,5-4 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Bażant syjamski / *Lophura diardi*

Bażanty syjamskie żywią się nasionami wielu roślin oraz różnymi gatunkami owadów.

Występuje w Północnych Indochinach, Wietnamie oraz na wschodnich terenach Tajlandii. Jego naturalnym środowiskiem są bardzo gęste lasy bambusowe i wiecznie zielone, rozciągające się od poziomu morza do wysokości 2000 stóp nad poziomem morza. Jak dotąd niewiele wiadomo o stanie wolno żyjącej populacji.

Długość ciała: 68-80 cm
Rozpiętość skrzydeł: 65-75 cm

Masa ciała: samiec ok. 1 kg
samica ok. 0,7 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Głuszc / Tetrao urogallus

Latem jadłospis niezwykle urozmaicony, obejmuje pędy wielu gatunków roślin, mrówki i ich larwy, inne drobne owady, pajęczaki oraz inne bezkręgowce, małe jaszczurki i gryzonie, a także owoce runa leśnego (głównie borówki). Zimą potrafią przetrwać jedząc tylko igły sosen, jodeł lub świerków, wykorzystując w trawieniu gastrolity.

Występuje od Pirenejów i Gór Dynarskich, po północno-zachodnią Mongolię. W wielu rejonach Europy głuszcze wymarły wskutek przekształcania lasów. W Polsce gatunek zanika. Nieliczne populacje występują jeszcze w Puszczy Augustowskiej, Karpatach Zachodnich, Karkonoszach i Lasach Janowskich (bardzo mała liczba).

Długość ciała: 54-115 cm
Rozpiętość skrzydeł: 120-145 cm

Masa ciała: samiec 3,9-6,5 kg
samica 1,7-2,5 kg



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Grzywacz / *Columba palumbus*

Występuje w Europie, Azji i Afryce. Spotkać go też można na południe od Azji Mniejszej, Kaszmiru i Iraku. Europejską populację szacuje się na 8-14 milionów par lęgowych. Wyróżnia się 5 podgatunków. Występuje równomiernie na terenie całej Polski, choć w górach jest mniej liczny. Jest średnio liczny ptakiem lęgowym.

Długość ciała: 40-46 cm
Rozpiętość skrzydeł: 70-80 cm

Masa ciała: 450-566 g

Pokarm głównie roślinny, nasiona traw, zbóż, krzewów, jagody, owoce drzew, młode liście. Żywi się również kwiatostanem akacji oraz owocami morwy.



PARK WROCŁAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Kulon / *Burhinus oedicnemus*

Żywi się głównie owadami, takimi jak pasikoniki i chrząszcze, poza tym zjada drobne ślimaki i dżdżownice.

Występuje od Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego przez Bałkany po Ukrainę i Kaukaz. Inne podgatunki zamieszkują w umiarkowanej strefie Europy, a także w Afryce i Azji, aż po równik. Zimuje w zachodnio-południowej Europie i Afryce. W Polsce występuje w dolinie Bugu i Narwi.

Długość ciała: 40-45 cm
Rozpiętość skrzydeł: 70-85 cm

Masa ciała: 350-500 g



PARK WROCLAWSKI • Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie • parki-lubina.pl

Wieloszon wietnamski / Polyplectron germaini

Zamieszkuje południowy Laos, południowy Wietnam i część Kambodży. Preferuje lasy deszczowe na wysokości 1200m n.p.m. W 1875r. sprowadzono te ptaki do Europy. Samce mają duże „pawie oczka”, czub dość krótki, a skóra na twarzy jest czerwona. Samice są mniejsze, także ich skóra na twarzy jest czerwona.

Długość ciała: 47-55 cm
Rozpiętość skrzydeł: 58-70 cm

Masa ciała: ok. 0,6-1 kg