

CZUBACZ HEŁMIASTY

łac. *Pauxi pauxi*, Linnaeus, 1766



WYSTĘPOWANIE

północno-wschodnia Kolumbia,
północno-zachodnia Wenezuela

POKARM

nasiona, opadłe owoce, liście,
kwiaty, drobne zwierzęta,
owady



85-92 cm

38,2-42,7 cm

3,5-3,75 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGTH

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA BLATTLÄNGE/WING LENGTH

MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

85-92 cm

36,3-38,5 cm

ok. 2,65 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



(PL) CZUBACZ HEŁMIASTY

Zamieszkuje tropikalne lasy lub ich obrzeża, a szczególnie lubi gęste zarośla. Obie płcie ubarwione są w taki sam sposób. Po wykluciu samice są najpierw czerwono-brązowe, dopiero potem wybarwiają się na czarno. Czubacze potrafią bardzo dobrze latać i sprawnie przemieszczają się z jednego drzewa na drugie. Zagrożeniem dla tego gatunku jest utrata siedlisk, polowania oraz kłusownictwo. Indianie umieszczają głowy ptaków przy wejściu do domu, a ich liczba wyznacza status społeczny gospodarza.

(DE) HELMHOKKO

Er lebt in tropischen Wäldern oder an deren Rändern und mag dichtes Buschwerk besonders. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Nach dem Schlüpfen sind die Weibchen zunächst rotbraun, erst später werden sie schwarz. Sie können sehr gut fliegen und bewegen sich effizient von einem Baum zum anderen. Eine Bedrohung ist für diese Art der Verlust von Lebensräumen, Jagd und Wilderei. Indianer platzieren Köpfe dieser Vögel am Eingang des Hauses; ihre Anzahl bestimmt den sozialen Status des Wirtes.

(EN) HELMETED CURASSOW

It lives in tropical forests or on their outskirts, and likes dense thickets in particular. Both sexes are coloured in the same way. After hatching the females are reddish-brown and only later become black. They can fly very well and move efficiently from one tree to another. Habitat loss presents a threat to this species, and so do hunting and poaching. Indigenous people of the Americas place the heads of these birds at the entrance to their houses; their number determines the social status of the host.