

GŁUSZEC

łac. *Tetrao urogallus*, Linnaeus, 1758




MAŁE
RYZYO
WYGINIĘCIA

WYSTĘPOWANIE

od Pirenejów i Gór Dynarskich,
po północno-zachodnią Mongo-
lię

POKARM

pędy roślin, mrówki i ich larwy,
drobne owady, bezkręgowce, igły
sosny, świerka, małe jaszczurki
i gryzonie, owoce runa leśnego



80-115 cm

120-145 cm

3,9-6,5 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGHT
ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ FLÜGELSPANNWEITE/WINGSPAN
MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

54-63 cm

96-104 cm

1,7-2,5 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



(PL) GŁUSZEC

Prowadzi osiadły tryb życia. Preferuje stare, dojrzałe bory iglaste, drzewostany sosnowe obfitujące w jagody, z domieszką osiki i świerka. Unika terenów otwartych. Wiosną można obserwować widowiskowe toki. Pieśń godowa dzieli się na cztery części: kłapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. Latem głuszce mają bardzo zróżnicowaną bazę pokarmową, natomiast zimę potrafią przetrwać jedząc tylko igły sosen, jodeł i świerków. W Polsce gatunek ten zanika w szybkim tempie, dlatego Lasy Państwowe prowadzą restytucję tego gatunku w kilku miejscach w kraju. Głuszec do 1995 r. znajdował się na liście ptaków łownych.

(DE) AUERHUHN

Es ist ein Standvogel. Es bevorzugt alte, reife Nadelwälder, sowie reiche an Blaubeeren Kieferbestände, mit Beimischung von Espen und Fichten. Das Auerhuhn vermeidet offene Flächen. Im Frühjahr kann man spektakuläre Bälze beobachten; das Balzrufen besteht aus vier Teilen. Im Sommer haben Auerhühner eine sehr vielfältige Nahrungsgrundlage, während sie im Winter auf einer Diät nur aus Nadeln von Kiefern, Tannen und Fichten überleben können. In Polen verschwindet diese Art schnell, deshalb versucht die Verwaltung von polnischen Staatsforsten diese Vögel in manchen Orten des Landes restituieren. Bis 1995 stand Auerhuhn auf der Liste der Jagdvögel.

(EN) WESTERN CAPERCAILLIE

It is a resident bird. It prefers old, mature coniferous forests, as well as pine stands rich in blueberries, with an admixture of aspen and spruce. The western capercaillie avoids open areas. In spring, spectacular courtship displays can be observed. The mating song is divided into four parts: double-clicks, trilling, popping and grinding. In summer they have a very varied food base, while in winter they can survive by eating solely pine, fir and spruce needles. In Poland, this species is disappearing at a rapid pace, which is why the State Forests are trying to restitute it in several places in the country. The western capercaillie was on the list of game birds until 1995.

facebook.com/ZOOLubin

ZOOLUBIN.PL