

USZAK BIAŁY

łac. *Crossoptilon crossoptilon*, Hodgson, 1838



WYSTĘPOWANIE

od wschodniego Tybetu
do południowo-zachodniego
Junnanu, zachodni Syczuan,
południowy Qinghai

POKARM

bulwy, korzonki, nasiona,
owady i ich larwy, jagody,
różne części roślin, młoda
kora



86-96 cm

27,2-39,5 cm

2,35-2,75 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE

DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGTH

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA BLATTLÄNGE/WING LENGTH

MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

86-96 cm

26,5-30,8 cm

1,45-2,05 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



(PL) USZAK BIAŁY

Występuje w wysokogórskich prześwie-
tlonych lasach z gęstym podszytem, na
wysokości 3000-4500 m n.p.m., w po-
bliżu źródeł wody (zimą zastępuje ją
śniegiem). W okresie zimowym łączą
się w większe grupy i schodzą do lasów
w niższych rejonach. Tak jak wszystkie
rodzaje uszaków, samce i samice ubar-
wione są jednakowo. W ziemi ryją tylko
dziobem, który jest do tego specjalnie
przystosowany (jest silny i szeroki).

(DE) WEIßER OHRFASAN

Er kommt in lichten Hochgebirgswäl-
dern mit dichtem Unterholz vor, auf
Höhen von 3000 bis 4500 m ü.M., in
der Nähe von Gewässer (die im Winter
durch Schnee ersetzt werden). Im
Winter schließen sich weiße Ohrfasane
zu größeren Gruppen und steigen in
Wälder in unteren Regionen ab. Wie bei
allen Arten von Ohrfasanen sind Männ-
chen und Weibchen dieser Spezies
gleich gefarbt. Sie wühlen in der Erde
nur mit ihrem Schnabel, der speziell
dafür angepasst ist (er ist stark und
breit).

(EN) WHITE-EARED PHEASANT

It can be found in high mountain fore-
sts with dense undergrowth, at altitu-
des between 3000 and 4500 m above
sea level, near water sources (in winter
they are replaced by snow). In winter,
they merge into larger bouquets and
descend into forests in lower regions.
As with all eared pheasants, the males
and females of this species are colo-
red equally. They dig in the ground
with their beaks only, which are spe-
cially adapted for it (they are strong
and wide).